

Wuxal Doble Suspensión

Fertilizante Foliar

Formulación	: Suspensión concentrada
Modo de Acción	: Rápida absorción foliar a nivel de la cutícula inter e intracelularmente
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso
Composición	: <i>Macronutrientes</i> : Nitrógeno 24%, Fósforo 24%, Potasio 18% <i>Micronutrientes</i> : Boro 0.3 g/l, Cobre 0.75 g/l, Fierro 1.5 g/l, Manganeso 0.75 g/l, Molibdeno 0.015 g/l, Zinc 0.75 g/l.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Nutriente foliar de muy alta concentración, con tecnología de punta en su formulación con alto contenido de nutrientes y en las formas más disponibles por las plantas. Posee dentro de su formulación adherente, surfactante, regulador de pH del agua, antievaporante, antiespumante y agentes quelatizantes. Recomendado por su alta eficiencia y uso en todos los cultivos tanto extensivos como intensivos, industriales y frutales.

Indicaciones de Uso

Puede aplicarse en cualquier fase de desarrollo del cultivo. Sin embargo es recomendable que se realicen aplicaciones fundamentalmente en prefloración y cuajado, siguiendo posteriormente con 3 a 5 aplicaciones a lo largo del ciclo de desarrollo del cultivo. En cultivos con sistemas de riego tecnificado, aplicar a los 30 minutos de haberse iniciado el riego.

Antes de uso debe agotarse vigorosamente antes de su uso. Medir la cantidad adecuada y disolverla en un recipiente pequeño, luego adicionar la solución al cilindro de aplicación que posea agua hasta la mitad, completar el volumen de agua y agitar vigorosamente para lograr una buena homogenización.

Es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común, sin embargo debido a su elevada concentración de nutrientes, no se recomienda mezclarlo con otros abonos foliares ni otros productos que tengan fuerte reacción alcalina.

Precauciones

Evitar el contacto con la piel y ropa. En caso de que

ocurra, lavarse de inmediato con abundante agua y jabón. Debe guardarse fuera del alcance de los niños



Wuxal Doble Suspensión

Fertilizante Foliar

Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	RECOMENDACIONES	DOSIS	
		l/cil 200l	l/ha
Papa, Tomate	Aplicaciones foliares solo o en mezcla con insecticidas o fungicidas. Frecuencia de aplicación: Cada 15 a 20 días.	0.6 - 0.8	1 - 3
Ají, Marigold		0.75 - 1.0	
Café	Aplicación durante la fase vegetativa, hasta antes de la floración. Frecuencia de aplicación cada 15 a 20 días	0.6 - 0.8	2 - 3
Algodón	Realizar 4 aplicaciones. Iniciar la 1ra aplicación con plántulas pequeñas de 5 a 6 hojas y repetirlas con un intervalo de 15 a 20 días	0.5 - 0.6	1 - 3
Arroz, Trigo, Cebada	Realizar la 1ra aplicación al inicio del macollamiento, con intervalos de 10 a 15 días.	0.6 - 0.8	2 - 4
Maíz, Sorgo	1ra aplicación: cuando la planta tiene 15 cm de altura y repetirlas cuando se apliquen con otros pesticidas	0.5 - 0.6	1 - 2
Vid, Cítricos, Manzano, Durazno, Olivo	Realizar las aplicaciones conjuntamente con otros pesticidas y repetirlas cada 10 a 15 días	0.4 - 0.6	2 - 3
Col, Coliflor, Brocoli, lechuga, Apio, Acelga	Aplicaciones desde el inicio del desarrollo vegetativo en mezcla con otros pesticidas. Frecuencia de aplicación: 8 a 10 días	0.5 - 0.6	1 - 3
Ajo, Cebolla, Poro	Aplicaciones foliares desde el inicio de del desarrollo del cultivo, con intervalos de 10 a 15 días	0.5 - 0.8	1 - 3
Zapallo, Sandía, Melón, Pepinillo	Aplicaciones foliares desde el inicio del crecimiento de las plantas hasta la floración con una frecuencia de 10 a 12 días	0.5 - 0.6	1 - 3
Quinua	Al inicio del desarrollo vegetativo, repetir cada 20 días.	0.5	--

Envases

: Frasco x 1 lt
Galonera x 10 lt

