

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 0800-1-3040, 3287700
ESSALUD: 4118000 Anexo 4 INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.



BIOZYME® TF

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Extractos de origen vegetal y fitohormonas biológicamente activas.....820,2 g/L
Giberelinas..... 0,031 g/L
Acido indol acético (Auxinas) 0,031 g/L
Citoquininas (Zeatinas)..... 0,083 g/L
Microelementos (Fe, Zn, Mg, Mn, B, S)..... 19,34 g/L

Registro PBUA N° 042-SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulado por:
GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.
Bldv. Jesús Valdéz Sánchez #2369
Saltillo, Coahuila, México C.P. 25290
Telf.: (844) 438-0500

Importado y Distribuido por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima- Perú.
Telf: 612-6565 , Fax: 348-1020



N° de lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
© Marca registrada por GBM, S.A. DE C.V.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BIOZYME® TF es un regulador de crecimiento vegetal, trihormonal (Auxinas, Citoquininas y Giberelinas), de origen natural. Su aplicación ayuda a restablecer la fisiología normal de las plantas para incrementar la cantidad y calidad de las cosechas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	DOSIS		FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	L/ha camp.	L/ha aplic.			
ARROZ	0,5	0,5	Inicio del macollaje	N.A.	N.A.
PAPA	1	0,5 0,5	1ª 20 a 25 cm de altura de plantas. 2ª Al inicio de la tuberización.	N.A.	N.A.
TOMATE	1	0,5 0,5	1ª A la floración (20 a 40% de flores abiertas). 2ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
CEBOLLA	1	0,3 0,3 0,4	1ª A los 30 días después del trasplante. 2ª A los 60 días después del trasplante. 3ª Al inicio de engrosamiento de bulbo.	N.A.	N.A.
ZAPALLO	1	0,5 0,5	1ª A la floración (5% de flores abiertas). 2ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
ALGODON	1	0,5 0,5	1ª Al inicio del botoneo. 2ª 3 semanas después de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
VID	1,5	0,5 0,5 0,5	1ª Al inicio del botoneo o estado de "pita". 2ª Al inicio de la floración o "cabeza de alfiler". 3ª Al inicio de cuajado.	N.A.	N.A.
ROSAS, CLAVEL CRISANTEMO	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la formación de botones. 2ª 2 a 3 semanas de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
FRÍJOL, ARVEJA HABA, PALLAR	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la floración. 2ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
NARANJO MANDARINO	----	1 ml/L de agua	1ª A la floración (20 a 40% de flores abiertas). 2ª Al cuajado de los frutos.	N.A.	N.A.
MANZANO, PERAL, MELOCOTON	----	1 ml/L de agua	Al 50 % de flores abiertas.	N.A.	N.A.
PAPRIKA	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la floración 2ª Al inicio del cuajado del fruto	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la formación del eje floral 2ª 2-3 semanas después de la 1ra aplicación	N.A.	N.A.
MANGO	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la floración 2ª Al inicio del cuajado de frutos	N.A.	N.A.
PALTO	----	200 - 250 ml/L 200 L de agua	1ª Al inicio de la floración 2ª Al inicio del cuajado de frutos	N.A.	N.A.
ARÁNDANO	----	250 - 300 ml/L 200 L de agua	1ª Al inicio de la floración 2ª 10 días después de la 1ra. aplicación	N.A.	N.A.

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos N.A.: No aplica

PERIODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada luego de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: BIOZYME® TF es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional

FITOTOXICIDAD: BIOZYME® TF no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



PRECAUCIÓN

