

CENTURION®

HERBICIDA

INFORMACION GENERAL

INGREDIENTE ACTIVO	Clethodim
NOMBRE QUIMICO	2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
GRUPO QUIMICO	Ciclohexanodiona
CONCENTRACION Y FORMULACION	125 g/L Concentrado Emulsionable (EC)
MODO DE ACCION	Sistémico
FABRICANTE/FORMULADOR	Arysta LifeScience North America, LLC. Estados Unidos.
TOXICIDAD	Ligeramente peligroso. Banda toxicológica azul. LD50 Oral ratas: > 5.000 mg/kg LD50 Dermal ratas:> 2.000 mg/kg
ANTIDOTO	No existe antídoto específico.
REGISTRO SENASA N°	PQUA N° 4064-SENASA

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

CENTURION® es un herbicida graminicida de acción post-emergente, efectivo en el control de gramíneas anuales y perennes, pero sin efecto contra malezas de hoja ancha ni ciperáceas. **CENTURION®** es absorbido rápidamente por las hojas, traslocándose hasta las raíces y rizomas.

Las gramíneas cultivadas no son tolerantes a **CENTURION®**, en cambio los cultivos de hoja ancha muestran una excelente tolerancia. Los mejores resultados se obtienen cuando las malezas están en crecimiento activo, bajo buenas condiciones de humedad y no pasan de 20 a 30 cm de altura.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Malezas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha		
ALCACHOFA	Rabo de zorro	<i>Setaria geniculata</i>	0.6	1.2	40	0.5
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>				
ALGODONERO	Rabo de zorro	<i>Setaria sp.</i>	0.5 - 0.6	1.0-1.2	14	0.5
PIMIENTO	Rabo de zorro	<i>Setaria geniculata</i>	0.6	1.2	20	0.5
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crusgavonis</i>				
CEBOLLA	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.5 - 0.6	1.0-1.2	54	0.5
ESPÁRRAGO	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	0.5 - 0.75	0.75-1.125	1	0.5
MANDARINA	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	0.5 - 0.6	1.0-1.2	5	0.1
VID	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	0.5 - 0.6	1.0-1.2	20	1
PIJUAYO	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.5 - 0.6	0.5-0.6	0	0.5
	Rabo de zorro	<i>Leptochloa fusca</i>				
	Pajilla	<i>Chloris radiata</i>				

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

La aplicación de **CENTURION®** se realizará previo monitoreo de campo. Se recomienda no más de 2 aplicaciones por campaña, con intervalos de 10 - 14 días. Rotar con Herbicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

Para el cultivo de Pijuayo, la aplicación se encuentra restringida entre los primeros 6 a 9 meses luego del trasplante. Realizar máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entrar al área tratada dentro de 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CENTURION® se mezcla fácilmente en agua. No se recomienda mezclarlo con fertilizantes ni productos de reacción alcalina. Se encontró un ligero antagonismo en los tanques de mezcla con algunos herbicidas post-emergentes de hoja ancha.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

® Marca Registrada



Realice el triple lavado de los envases y elimine en los centros de acopio autorizados de Campo Limpio.

www.campolimpio.org.pe