# FASTERMIX ®

| *Fecha de actualización: 29-09-2026* | *Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización* |
|---|---|

## I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

**Producto:** FASTERMIX

**No Registro:** PQUA N° 1647 - SENASA

**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Distribuidor**: Comercial Andina Industrial S.A.C

**Clase de uso**: FUNGICIDA AGRICOLA

## II. INGREDIENTES ACTIVOS

Azoxystrobin 250 g/kg + Tebuconazole 500 g/kg

## III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Solido
- Color: Marrón
- Olor: Característico
- Densidad: No aplica
- pH: 7.5 ± 1.5 (1% en solución)
- Solubilidad en agua: No aplica
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

## IV. FORMULACION

Granulos Dispersables – WG

## V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FASTERMIX® es una mezcla de 2 ingredientes activos de tipo fungicidas de acción sistémico y que se complementan de manera efectiva en el control de las principales enfermedades que dañan a los cultivos.

## VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

Tebuconazole, actúa por interferencia de la biosíntesis de ergosterol de la membrana celular del hongo. Azoxystrobin, Inhibe la germinación de las esporas y crecimiento micelial, y también muestra actividad antiesporulante.

## VII. USOS REGISTRADOS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P.C (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | Kg/cil | Kg/ha | | |
| Vid | Oidium | *Erysiphe necator* | 0.1 | - | 14 | Tebuconazole 6<br>Azoxystrobin 3 |
| Arroz | Pyricularia | *Pyricularia oryzae* | - | 0.2 | 35 | Tebuconazole 1.5<br>Azoxystrobin 5 |
| Maiz | Mancha negra del maíz | *Phyllachora maydis* | 0.1 | - | 15 | Tebuconazole 0.02<br>Azoxystrobin 0.02 |
| Café | Roya del cafeto | *Hemileia vastatrix* | 0.2 | 0.4 | 30 | Tebuconazole 0.1<br>Azoxystrobin 0.03 |
| Espárrago | Mancha del peral | *Stemphylium vesicarium* | 0.15 | 0.4 | 100 | Tebuconazole 0.05<br>Azoxystrobin 0.01 |

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del cultivo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña

## IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría III – Ligeramente peligroso – Cuidado

## X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.